

難雑防除

「クログワイ」をしっかりと枯らす。



クログワイ (カヤツリグサ科) 多年草

もちろん、
その他雑草も
まとめて防除!



アゼナ



ウリカワ



ホタルイ



タイヌビエ



オモダカ



コナギ



ミスガヤツリ



農林水産省登録 第22146号

水稲用 中期除草剤

クサファイター®

1キロ粒剤



三井化学アグロ株式会社

クサファイターは三井化学アグロ(株)の登録商標です。

水稲用 中期除草剤

クサファイター[®]1キロ粒剤

●有効成分：アジムスルフロン……………0.18%
シハロホップブチル……………1.80%

●人畜毒性：普通物※
※「毒物および劇物取締法」(厚生労働省)に基づく、
特定毒物、毒物、劇物の指定を受けない物質を示す。

特長

- 1.前処理剤との体系で使用する場合の水稲用中期除草剤です。
- 2.アジムスルフロン配合により、幅広い雑草に効果があります。
- 3.シハロホップブチル配合により、ノビエの3.5葉期まで効果があります。
- 4.広範囲の雑草に、優れた効果で長い効きめを示します。

■殺草スペクトラム

	ノビエ	カヤツリグサ	コナギ	その他広葉	マツバイ	ホタルイ	ミスガヤツリ	ウリカワ	クログワイ	オモダカ	ヘラオモダカ	コウキヤガラ	シズイ
アジムスルフロン	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
シハロホップブチル	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
クサファイター1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

効果 極大：○ 大：○ 中：△ 小：×

■適用雑草及び使用方法

(2015年7月現在)

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	10アール当り使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯
移植水稲	水田一年生雑草及び マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ(東北) ミスガヤツリ ウリカワ クログワイ オモダカ コウキヤガラ(北陸を除く) シズイ(東北) ヒルムシロ セリ(九州を除く)	移植後20日～ ノビエ3.5葉期 ただし、 収穫30日前まで	砂壤土～ 埴土	1kg	1回	湛水 散布	全域(北海道を除く)の普通期及び早期栽培地帯

各有効成分を含む農薬の総使用回数：アジムスルフロン1回、シハロホップブチル3回以内

■上手な使い方



※SU抵抗性雑草が多発する圃場では、SU抵抗性雑草に効果のある前処理剤との体系で使用してください。

⚠️ 使用上の注意事項

- 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
- 多年生雑草は生育段階によって効果にブレが出るので、必ず適期に散布するように注意してください。ホタルイ、ヘラオモダカ、ミスガヤツリ(東北、北陸、近畿・中国・四国)、ウリカワ(九州を除く)は3葉期まで、ミスガヤツリ(関東・東山・東海、九州)、ウリカワ(九州)は4葉期まで、クログワイは生育期(草丈20cm以下)まで、オモダカは広線形葉4葉期まで、コウキヤガラは生育期(草丈10～15cm)まで、シズイは草丈10cmまで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生始期までが本剤の散布適期です。
- クログワイ(関東・東山・東海、近畿・中国・四国、九州)、オモダカは、必要に応じて有効な後処理剤と組み合わせて使用してください。クログワイ(東北、北陸、近畿・中国・四国、九州)、オモダカ(九州)、コウキヤガラは、有効な前処理剤と組み合わせて使用してください。また、クログワイ、オモダカに有効な後処理剤と組み合わせて連年施用することによ

- り、さらに効果が向上します。
- 苗の植付けが均一となるように代かきを丁寧に行ってください。未熟有機物を施用した場合は、特に丁寧に行ってください。
- 散布に当たっては、水の出入りを止めて湛水のまま田面に均一に散布し、少なくとも3～5日間は通常の湛水状態(水深3～5cm)を保ち、散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。また、止水期間中の入水は静かに行ってください。
- 移植前後の初期除草剤による土壌処理との体系で使用し、雑草の発生状況をよく観察し、時期を失しないよう適期に散布してください。
- 下記のような条件では葉害が発生する恐れがあるので使用を避けてください。
 - ①砂質土壌の水田及び漏水田(減水深2cm/日以上)
 - ②軟弱な苗を移植した水田
 - ③極端な浅植の水田及び浮き苗の多い水田

- ④稲の根が露出している水田
- 本剤はその殺草特性から、とうもろこし、食用びえ、ソルガム等のイネ科作物の生育を阻害するおそれがあるので、散布田の水田水をこれら作物に灌水しないようにしてください。
- 空袋等は圃場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。
- 河川、湖沼、地下水等を汚染しないよう、落水、かけ流しはしないでください。
- 本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合や異常気象時は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをお勧めします。
- 誤食などのないよう注意してください。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないでください。

- 使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- 容器・空袋などは圃場などに放置せず、適切に処理してください。●防除日誌を記載しましょう。

*本製品は農業用除草剤であり、製品ラベルの記載以外には使用しないでください。

**本印刷物は2015年7月現在の資料、情報、データ等に基づいて作成していますが、記載データ及び評価はあくまでも測定値の代表例であり、全ての事例に当てはまるものではありません。

KFG1G11J



三井化学アグロ株式会社

東京都中央区日本橋 1-19-1 日本橋ダイヤビルディング
ホームページ <http://www.mitsui-agro.com/>