



SU 抵抗性[※] 雑草に 3 成分で 優れた効きめ!!



水稲用 初・中期 一発処理除草剤

クサオウジ[®]

1キロ粒剤75 Hフロアブル Hジャンボ

フェントラザミド・プロモブチド
・ベンスルフロンメチル
クサオウジは三井化学アグロ(株)の登録商標です

- ノビエ2.5葉期まで使えます!
- 低温時でも安定した効きめ!

SU抵抗性雑草[※]に!

※スルホニルウレア系除草剤に抵抗性を獲得した雑草(アゼナ類、ホタルイ、コナギ等)のことを言います。



アゼナ



アメリカアゼナ



タケトアゼナ



コナギ



ノビエ



ホタルイ



1キロ粒剤に 大容量 10kg入 も登場!



JAグループ 農協 全農 経済連

全農 は登録商標 第4702318号

クサオウジ®

※「毒物および劇物取締法」(厚生労働省)に基づく、特定毒物、毒物、劇物の指定を受けない物質を示す。

■農林水産省登録 第22198号 ■人畜毒性:普通物*

■有効成分:フェントラザミド…3.0% プロモプチド…6.0% ベンシルフロンメチル…0.75%

【2015年4月15日現在】

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	10アール当たりの使用量	本剤の使用回数	フェントラザミドを含む農薬の総使用回数	プロモプチドを含む農薬の総使用回数	ベンシルフロンメチルを含む農薬の総使用回数	使用方法	適用地帯
移植水稻	水田一年生雑草 および マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ(東北) ウリカワ クログワイ(東北) オモダカ ヒルムシロ セリ シズイ(東北) アオミドロ・藻類による表層はく離	移植時	砂壤土～埴土	1 kg	1回	1回	2回以内	2回以内	田植同時散布機で施用	北海道 東北
		移植直後～ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで							湛水散布	
直播水稻	水田一年生雑草 および マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ウリカワ	稲1葉期～ノビエ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで	埴土～埴土							

◆東北の使用時期 (移植水稻の場合)



- 誤食などのないように注意してください。
- 水産動植物(藻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 散布後は水管理に注意してください。
- 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

■農林水産省登録 第22199号 ■人畜毒性:普通物*

■有効成分:フェントラザミド…6.0% プロモプチド…18.0% ベンシルフロンメチル…1.4%

【2015年4月15日現在】

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	10アール当たりの使用量	本剤の使用回数	フェントラザミドを含む農薬の総使用回数	プロモプチドを含む農薬の総使用回数	ベンシルフロンメチルを含む農薬の総使用回数	使用方法	適用地帯
移植水稻	水田一年生雑草 および マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ(東北) ウリカワ クログワイ(東北) オモダカ ヒルムシロ セリ シズイ(東北) エゾノサヤヌカグサ(北海道) アオミドロ・藻類による表層はく離	移植時	砂壤土～埴土	500mℓ	1回	1回	2回以内	2回以内	田植同時散布機で施用	北海道 東北
		移植直後～ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで							原液湛水散布	
直播水稻	水田一年生雑草 および マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ	湛水直播の稲1葉期～ノビエ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで	埴土～埴土							

◆東北の使用時期 (移植水稻の場合)



- 誤飲などのないように注意してください。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼には入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗い、眼科医の手当てを受けてください。使用後は水洗いしてください。
- 水産動植物(藻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 散布後は水管理に注意してください。
- 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。


■農林水産省登録 第22197号 ■人畜毒性:普通物*

■有効成分:フェントラザミド…7.5% プロモプチド…15.0% ベンシルフロンメチル…1.87%

【2015年4月15日現在】

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	10アール当たりの使用量	本剤の使用回数	フェントラザミドを含む農薬の総使用回数	プロモプチドを含む農薬の総使用回数	ベンシルフロンメチルを含む農薬の総使用回数	使用方法	適用地帯
移植水稻	水田一年生雑草 および マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ウリカワ ミズガヤツリ(東北) クログワイ(東北) オモダカ ヒルムシロ セリ アオミドロ・藻類による表層はく離	移植後3日～ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで	砂壤土～埴土	小包装(パック) 10個(400g)	1回	1回	2回以内	2回以内	水田に小包装(パック)のまま投げ入れる。	北海道 東北

◆東北の使用時期



- パックに使用しているフィルムは水溶性なので、ぬれた手で作業したり、降雨で破袋することのないよう注意してください。
- 水溶性フィルム包装が破袋した場合は以下の点に注意してください。
①本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗い、眼科医の手当てを受けてください。
②かぶれやすい体質の人は取扱に十分注意してください。
- 水産動植物(藻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 散布後は水管理に注意してください。
- 空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

◎SU抵抗性雑草(アゼナ、ホタルイ、コナギ等)の発生地域では登録の範囲内でできるだけ早く使用してください。 ◎雑草の発生消長にあわせ、適期に散布してください。

- 使用前にはラベルをよく読んでください。 ○ラベルの記載以外には使用しないでください。 ○本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- 容器・空袋などは園場などに放置せず、適切に処理してください。 ○防除日誌を記載しましょう。

*本製品は農業用除草剤であり、製品ラベルの記載内容以外には使用しないでください。

*本印刷物は2015年4月15日現在の資料、情報、データ等に基づいて作成していますが、記載データ及び評価はあくまでも測定値の代表例であり、全ての事例に当てはまるものではありません。

1キロ粒剤75

Hフロアブル

Hジャンボ