

まき方選べる 3 製剤

水稲用 初・中期一発処理除草剤



MIC シロノック®

1キロ粒剤 51・Lフロアブル・Lジャンボ

除草パワー全開！
頑固な草にも
よく効きます。



農林水産省登録 第22409号



農林水産省登録 第22408号



農林水産省登録 第22458号

田植同時処理も
できます。
(1キロ粒剤51)

SU抵抗性
雑草※にも
効く!!

※スルホニルウレア系除草剤に抵抗性を獲得した雑草(アゼナ類、ホタルイ、コナギ等)のことを言います。



農林水産省「稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル」に掲載された農薬です。



アゼナ



イヌホタルイ



コナギ



セリ



イボクサ



ヒルムシロ



ノビエ



オモダカ



クログワイ



アオミドロ



三井化学アグロ株式会社

シロノックは三井化学アグロ(株)の登録商標

水稲用初・中期一発処理除草剤

MIC シロバック®

特長

1. 難防除雑草を含む広範囲の雑草に優れた効果で長い効きめ。
2. アゼナ類、ホタルイ、コナギ等SU抵抗性雑草に高い効果。
3. ベンゾピシクロン配合で、畦畔からの侵入雑草にも優れた効果。
4. ダイムロン配合により、水稲に対して高い安全性。

※「毒物および劇物取締法」(厚生労働省)に基づく、特定毒物、毒物、劇物の指定を受けない物質を示す。


1キロ粒剤51

- 人畜毒性:普通物※
- 有効成分:カフェンストロール…3.0% ダイムロン…6.0%
ベンシルフロメチル…0.51% ベンゾピシクロン…2.0%
(2019年11月6日現在)

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法
移植水稲	一年生雑草及びマツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	移植時	1kg /10a	1回	田植同時 散布機で施用
		移植直後～ノビエ2.5葉期 ただし、 移植後30日まで			湛水散布
直播水稲	一年生雑草及びマツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ	稲1葉期～ノビエ2.5葉期 ただし、 収穫90日前まで			

■各有効成分を含む農薬の総使用回数 ●カフェンストロール:1回 ●ダイムロン:移植水稲/3回以内
(育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内)、直播水稲/2回以内 ●ベンシルフロメチル:2回以内
●ベンゾピシクロン:3回以内

■上手な使い方



△使用上の注意

- 誤食などのないよう注意してください。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないでください。
- 水産動植物(藻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 散布後は水管理に注意してください。
- 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物等に影響を与えないよう適切に処理してください。


Lフロアブル

- 人畜毒性:普通物※
- 有効成分:カフェンストロール…5.5% ダイムロン…10.0%
ベンシルフロメチル…1.0% ベンゾピシクロン…4.0%
(2019年11月6日現在)

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法
移植水稲	一年生雑草及びマツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	移植後3日～ノビエ2.5葉期 ただし、 移植後30日まで	500ml /10a	1回	原液湛水散布 または 水口施用
		稲1葉期～ノビエ2.5葉期 ただし、 収穫90日前まで			原液湛水 散布
直播水稲	一年生雑草及びマツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ	稲1葉期～ノビエ2.5葉期 ただし、 収穫90日前まで			

■各有効成分を含む農薬の総使用回数 ●カフェンストロール:1回 ●ダイムロン:移植水稲/3回以内
(育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内)、直播水稲/2回以内 ●ベンシルフロメチル:2回以内
●ベンゾピシクロン:3回以内

■上手な使い方



△使用上の注意

- 誤飲などのないよう注意してください。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入らないよう注意してください。
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。使用後は洗眼してください。
- 水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないでください。
- 水産動植物(藻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 散布後は水管理に十分注意してください。
- 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。


Lジャンボ

- 人畜毒性:普通物※
- 有効成分:カフェンストロール…7.1% ダイムロン…14.3%
ベンシルフロメチル…1.5% ベンゾピシクロン…5.7%
(2019年11月6日現在)

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法
移植水稲	一年生雑草及びマツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、クログワイ、オモダカ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	移植後3日～ノビエ2.5葉期 ただし、 移植後30日まで	小包装(パック) 10個 (350g) /10a	1回	水田に 小包装(パック) のまま 投げ入れる
		稲1葉期～ノビエ2.5葉期 ただし、 収穫90日前まで			
直播水稲	一年生雑草及びマツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ	稲1葉期～ノビエ2.5葉期 ただし、 収穫90日前まで			

■各有効成分を含む農薬の総使用回数 ●カフェンストロール:1回 ●ダイムロン:移植水稲/3回以内
(育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内)、直播水稲/2回以内 ●ベンシルフロメチル:2回以内
●ベンゾピシクロン:3回以内

■上手な使い方



△使用上の注意

- 本剤は水溶性フィルムで小包装化されているため、通常の使用方法では人畜に影響はありません。ただし、濡れた手で触らないでください。
- 水溶性フィルム包装が破袋した場合は以下の点に注意してください。
①眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
②かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないでください。
- 水産動植物(藻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 散布後は水管理に注意してください。
- 空容器、空袋等は水産動植物等に影響を与えないよう適切に処理してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。●容器・空袋などは農場などに放置せず、適切に処理してください。●防除日誌を記帳しましょう。

*本製品は農業用除草剤であり、製品ラベルの記載以外には使用しないでください。

*本印刷物は2019年11月6日現在の資料、情報、データ等に基づいて作成していますが、記載データ及び評価はあくまでも測定値の代表例であり、全ての事例に当てはまるものではありません。

SRX10L1F



三井化学アグロ株式会社

東京都中央区日本橋1-19-1 日本橋ダイヤビルディング
ホームページ <http://www.mitsui-agro.com/>