

**FMC**

重要害虫の加害、即効ストップ。  
美しい収穫へ。

「無人航空機  
による散布」  
新規登録拡大!

葉のすみずみまで浸達、高い効果を素早く発揮!  
葉裏や作物内部に侵入、加害する害虫も、取りこぼさない!

主な適用害虫



\*1 提供: 柴尾学氏 \*2 原図提供: 徳丸晋虫氏(京都府農林水産技術センター)



ジアミド剤のプロ **FMC** の卓効成分  
シアントラニプロール (通称: サイアジビル®) を、**10.3%** 高配合!

葉裏まで  
すばやく浸達!

長期  
残効!

MIC  
**ベネビア**®  
OD

野菜散布用殺虫剤

powered by  
**CYAZYPYR**®  
ACTIVE INGREDIENT



- 特長 1** 葉裏のすみずみまでしっかり浸達! 作物内部に侵入、加害する害虫も、取りこぼさない!
- 特長 2** 1成分で幅広い害虫に高い効果! 万全ローテーションの要になります。
- 特長 3** 長期残効で、大事な生育期、収穫期を守り切る!
- 特長 4** 効かなきゃ困る、重要害虫の産卵、吸汁・摂食、食入・食害を、害虫死を待たず**即効ストップ!** 害虫による**ウイルス媒介も抑制\***!
- 特長 5** **ミツバチ・マルハナバチ**(散布翌日の(放飼が可能))や**天敵にも安全。混用事例も豊富**です!

詳しい混用事例はこちらから➔



\*タバコナジラミによる、トマト黄化葉巻病、ミナミキイロアザミウマによる、きゅうり/メロン黄化萎縮病

■適用害虫と使用方法

2022年1月12日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニプロロールを含む農薬の総使用回数															
キャベツ	コナガ、アオムシ ヨトウムシ、ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ、ウバエ類、オオタバコガ	2000~4000倍	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、 定植後の処理は3回以内)															
	アザミウマ類、アブラムシ類	20倍	1~2ℓ/10a			無人航空機による散布																
	アブラムシ類、ハモグリバエ類、キスジノミハムシ ヨトウムシ	2000倍	100~300ℓ/10a			散布																
はくさい	コナガ、アオムシ、ヨトウムシ ハスモンヨトウ、ハイマダラノメイガ	2000~4000倍	100~300ℓ/10a			収穫前日まで	3回以内	散布	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、 定植後の散布は3回以内)													
	アブラムシ類、キスジノミハムシ	2000倍						無人航空機による散布														
	アブラムシ類、ハモグリバエ類、キスジノミハムシ ヨトウムシ	4000倍						散布														
だいこん	コナガ、アオムシ、ハイマダラノメイガ カブラハバチ、ダイコンサルハムシ	2000~4000倍	1~2ℓ/10a					収穫前日まで	3回以内	無人航空機による散布	4回以内 (は種時までの処理は1回以内、 は種後の処理は3回以内)											
	アブラムシ類、ハモグリバエ類 キスジノミハムシ、ヨトウムシ	20倍								散布												
	アオムシ、ハスモンヨトウ コナガ	2000~4000倍								100~300ℓ/10a		無人航空機による散布										
ブロッコリー	アオムシ、ハスモンヨトウ コナガ	2000~4000倍	1~2ℓ/10a							収穫前日まで	3回以内	散布	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、 定植後の処理は3回以内)									
	アザミウマ類 アブラムシ類	20倍										無人航空機による散布										
	アオムシ類、コナジラミ類 アザミウマ類、ハモグリバエ類	2000倍										散布										
トマト ミニトマト	オオタバコガ	2000~4000倍	100~300ℓ/10a									収穫前日まで	3回以内	散布	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、 定植後の散布は3回以内)							
	アブラムシ類、コナジラミ類 アザミウマ類、ハモグリバエ類	2000倍												無人航空機による散布								
	アブラムシ類、コナジラミ類、アザミウマ類 ハモグリバエ類、ウリノメイガ	2000倍												散布								
きゅうり	アオムシ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ ハモグリバエ類、アブラムシ類	2000~4000倍												100~300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、 定植後の散布は3回以内)				
	アオムシ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ ハモグリバエ類、アブラムシ類	2000倍															無人航空機による散布					
	アオムシ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ ハモグリバエ類、アブラムシ類	2000倍															散布					
レタス 非結球レタス	アオムシ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ ハモグリバエ類、アブラムシ類	2000~4000倍		100~300ℓ/10a	収穫前日まで												3回以内	散布	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、 定植後の散布は3回以内)			
	アオムシ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ ハモグリバエ類、アブラムシ類	2000倍																無人航空機による散布				
	アオムシ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ ハモグリバエ類、アブラムシ類	2000倍																散布				
ピーマン	アオムシ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ ハモグリバエ類、アブラムシ類	2000~4000倍				100~300ℓ/10a	収穫前日まで											3回以内	散布	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、 定植後の散布は3回以内)		
	アオムシ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ ハモグリバエ類、アブラムシ類	2000倍																	無人航空機による散布			
	アオムシ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ ハモグリバエ類、アブラムシ類	2000倍																	散布			
ししとう	アオムシ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ ハモグリバエ類、アブラムシ類	2000~4000倍						100~300ℓ/10a	収穫前日まで										3回以内	散布	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、 定植後の散布は3回以内)	
	アオムシ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ ハモグリバエ類、アブラムシ類	2000倍																		無人航空機による散布		
	アオムシ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ ハモグリバエ類、アブラムシ類	2000倍																		散布		
いちご	アオムシ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ ハモグリバエ類、アブラムシ類	2000~4000倍								100~300ℓ/10a	収穫前日まで									3回以内	散布	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、 定植後の散布は3回以内)
	アオムシ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ ハモグリバエ類、アブラムシ類	4000倍																			無人航空機による散布	
	アオムシ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ ハモグリバエ類、アブラムシ類	2000倍																			散布	
アスパラガス	アオムシ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ ハモグリバエ類、アブラムシ類	2000~4000倍	100~300ℓ/10a									収穫前日まで	3回以内								散布	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、 定植後の散布は3回以内)
	アオムシ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ ハモグリバエ類、アブラムシ類	4000倍																			無人航空機による散布	
	アオムシ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ ハモグリバエ類、アブラムシ類	2000倍																			散布	
オクラ	アオムシ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ ハモグリバエ類、アブラムシ類	2000倍												100~300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内					散布	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、 定植後の散布は3回以内)
	アオムシ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ ハモグリバエ類、アブラムシ類	2000倍																			無人航空機による散布	
	アオムシ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ ハモグリバエ類、アブラムシ類	2000倍																			散布	
えだまめ	アオムシ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ ハモグリバエ類、アブラムシ類	2000~4000倍		100~300ℓ/10a	収穫前日まで												3回以内				散布	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、 定植後の散布は3回以内)
	アオムシ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ ハモグリバエ類、アブラムシ類	2000倍																			無人航空機による散布	
	アオムシ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ ハモグリバエ類、アブラムシ類	2000倍																			散布	
だいず	アオムシ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ ハモグリバエ類、アブラムシ類	2000~4000倍				100~300ℓ/10a	収穫前日まで											3回以内			散布	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、 定植後の散布は3回以内)
	アオムシ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ ハモグリバエ類、アブラムシ類	32倍																			無人航空機による散布	
	アオムシ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ ハモグリバエ類、アブラムシ類	2000~4000倍																			散布	
さやいんげん	アオムシ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ ハモグリバエ類、アブラムシ類	2000倍						100~300ℓ/10a	収穫前日まで										3回以内		散布	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、 定植後の散布は3回以内)
	アオムシ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ ハモグリバエ類、アブラムシ類	4000倍																			無人航空機による散布	
	アオムシ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ ハモグリバエ類、アブラムシ類	20倍																			散布	
かぼちゃ	アオムシ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ ハモグリバエ類、アブラムシ類	2000倍								100~300ℓ/10a	収穫前日まで									3回以内	無人航空機による散布	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、 定植後の散布は3回以内)
	アオムシ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ ハモグリバエ類、アブラムシ類	2000倍																			散布	
	アオムシ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ ハモグリバエ類、アブラムシ類	20倍																			無人航空機による散布	
ねぎ	アオムシ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ ハモグリバエ類、アブラムシ類	20倍	100~300ℓ/10a									収穫前日まで	3回以内								無人航空機による散布	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、 定植後の散布は3回以内)
	アオムシ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ ハモグリバエ類、アブラムシ類	2000倍																			散布	
	アオムシ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ ハモグリバエ類、アブラムシ類	2000倍																			無人航空機による散布	
たまねぎ	アオムシ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ ハモグリバエ類、アブラムシ類	2000倍												100~300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内					散布	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、 定植後の散布は3回以内)
	アオムシ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ ハモグリバエ類、アブラムシ類	20倍																			無人航空機による散布	
	アオムシ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ ハモグリバエ類、アブラムシ類	2000~4000倍																			散布	
にんにく	アオムシ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ ハモグリバエ類、アブラムシ類	2000倍		100~300ℓ/10a	収穫前日まで												3回以内				散布	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、 定植後の散布は3回以内)
	アオムシ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ ハモグリバエ類、アブラムシ類	2000倍																			無人航空機による散布	
	アオムシ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ ハモグリバエ類、アブラムシ類	20倍																			散布	
やまのいも	アオムシ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ ハモグリバエ類、アブラムシ類	4000倍				100~300ℓ/10a	収穫前日まで											3回以内			無人航空機による散布	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、 定植後の散布は3回以内)
	アオムシ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ ハモグリバエ類、アブラムシ類	40倍																			散布	
	アオムシ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ ハモグリバエ類、アブラムシ類	4000倍																			無人航空機による散布	
かんしょ	アオムシ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ ハモグリバエ類、アブラムシ類	4000倍						100~300ℓ/10a	収穫前日まで										3回以内		無人航空機による散布	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、 定植後の散布は3回以内)
	アオムシ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ ハモグリバエ類、アブラムシ類	4000倍																			散布	
	アオムシ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ ハモグリバエ類、アブラムシ類	4000倍																			無人航空機による散布	
ばれいしょ	アオムシ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ ハモグリバエ類、アブラムシ類	40倍								100~300ℓ/10a	収穫前日まで									3回以内	無人航空機による散布	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、 定植後の散布は3回以内)
	アオムシ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ ハモグリバエ類、アブラムシ類	2000倍																			散布	
	アオムシ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ ハモグリバエ類、アブラムシ類	4000倍																			無人航空機による散布	
にんじん	アオムシ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ ハモグリバエ類、アブラムシ類	2000倍	100~300ℓ/10a									収穫前日まで	3回以内								無人航空機による散布	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、 定植後の散布は3回以内)
	アオムシ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ ハモグリバエ類、アブラムシ類	4000倍																			散布	
	アオムシ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ ハモグリバエ類、アブラムシ類	4000倍																			無人航空機による散布	
未成熟 とうもろこし	アオムシ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ ハモグリバエ類、アブラムシ類	2000倍												100~300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内					無人航空機による散布	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、 定植後の散布は3回以内)
	アオムシ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ ハモグリバエ類、アブラムシ類	40倍																			散布	
	アオムシ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ ハモグリバエ類、アブラムシ類	4000倍																			無人航空機による散布	
たばこ	アオムシ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ ハモグリバエ類、アブラムシ類	4000倍		100~180ℓ/10a	収穫前日まで												2回以内				散布	2回以内
	アオムシ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ ハモグリバエ類、アブラムシ類	4000倍																			無人航空機による散布	
	アオムシ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ ハモグリバエ類、アブラムシ類	4000倍																			散布	

●ラベルをよく読んでください。 ●記載以外には使用しないでください。 ●小児の手の届く所には置かないでください。  
●空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し、環境に影響のないよう適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。 ●防除日誌を記載しましょう。

©2022 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC、FMCロゴ、®を付した商標は、FMC Corporationまたはその米国およびその他の国の子会社・関連会社の登録商標です。 BNV1003M