

登録番号 第 22696 号

アニキ[®]乳剤

●チョウ目害虫に加えて、ハモグリバエ類、コナジラミ類、アザミウマ類などの微小害虫も、まとめて防除することができます。

特長：●食毒と接触によるダブルの殺虫作用により、速攻的な効果を発揮します。

●ミツバチ、マルハナバチへの安全日数は1日です。

●天敵、微生物農薬に対する影響が小さく、IPMに適しています。

有効成分	レピメクチン・・・1.0%	包装	100ml×30 250ml×20 500ml×20
性状	淡黄色澄明可乳化油状液体	有効年限	5年
毒性	普通物 [※]	危険物	3石-III (指定数量4000L(水溶性))

※普通物：「毒物及び劇物取締法」（厚生労働省）に基づく、特定毒物、毒物、劇物の指定を受けない物質を示す。

【適用害虫及び使用方法】

2022年11月9日付内容

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	レピメクチンを含む農薬の総使用回数
みかん	チャノキイロアザミウマ アゲハ類	1000～4000倍	200～700 L/10a	収穫前日 まで	4回以内	散布	4回以内
	ミカンハモグリバエ	1000～2000倍					
	ミカンサビダニ	2000～4000倍					
	チャノコリダニ	4000倍					
かんきつ(みかんを除く)	チャノキイロアザミウマ アゲハ類	1000～4000倍	200～700 L/10a	収穫3日前 まで	4回以内	散布	4回以内
	ミカンハモグリバエ	1000～2000倍					
	ミカンサビダニ	2000～4000倍					
	チャノコリダニ	4000倍					
だいち	ハセンヨトウ	2000～3000倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内
えだまめ	ハセンヨトウ	2000～3000倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内
さといも	ハセンヨトウ	2000倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内
かんしょ	ハセンヨトウ カジロシタバ	2000～3000倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	レピメクチンを含む農薬の総使用回数
豆類 (未成熟、ただし、えだまめ、さやえんどうを除く)	ハスモンヨトウ	2000倍	100～300 L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
さやえんどう	ハスモンヨトウ	2000倍	100～300 L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
	ハゲリハエ類	1000倍					
メロン	ハゲリハエ類 コジラミ類	2000倍	100～300 L/10a	収穫前日まで	4回以内	散布	4回以内
すいか	オタバコガ	1000倍	100～300 L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
アスパラガス	コジラミ類	1000倍	100～300 L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
	ハスモンヨトウ	2000倍					
いちご	ハスモンヨトウ	2000倍	100～300 L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
	オタバコガ	1000～2000倍					
トマト	オタバコガ ハスモンヨトウ ハゲリハエ類 トマトザビダニ	2000倍	100～300 L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
	コジラミ類 ミカンキイロアザミウマ	1000～2000倍					
ミニトマト	オタバコガ ハスモンヨトウ ハゲリハエ類 トマトザビダニ	2000倍	100～300 L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
	コジラミ類 ミカンキイロアザミウマ	1000～2000倍					
なす	ハスモンヨトウ コジラミ類	1000～2000倍	100～300 L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
	オタバコガ ハゲリハエ類 チャノホリダニ	2000倍					
ピーマン	コジラミ類	1000～2000倍	100～300 L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
	ハスモンヨトウ オタバコガ チャノホリダニ	2000倍					
とうがらし類	コジラミ類	1000～2000倍	100～300 L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
	ハスモンヨトウ オタバコガ チャノホリダニ	2000倍					
きゅうり	コジラミ類	1000倍	100～300 L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
	ハスモンヨトウ	2000倍					

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	レピメクチンを含む 農薬の総使用回数
ほうれんそう	ハモシヨトウ	1000～2000 倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで	3 回以内	散布	3 回以内
セリー	ハモシヨトウ	1000～2000 倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで	3 回以内	散布	3 回以内
カブラー	コガ ハモシヨトウ	1000～2000 倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで	3 回以内	散布	3 回以内
非結球あぶらな科葉 菜類	コガ ハモシヨトウ キジノミハシ ハメグリハエ類	1000～2000 倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで	3 回以内	散布	3 回以内
非結球レタ	オタバコガ ハモシヨトウ	1000～2000 倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで	3 回以内	散布	3 回以内
レタ	オタバコガ ハモシヨトウ シイモシヨトウ	1000～2000 倍	100～300 L/10a	収穫 3 日前 まで	3 回以内	散布	3 回以内
キャベツ	コガ アムシ ハモシヨトウ ハイダラメガ ウバ類 オタバコガ	1000～2000 倍	100～300 L/10a	収穫 3 日前 まで	3 回以内	散布	3 回以内
	シイモシヨトウ	2000 倍					
はくさい	キジノミハシ ダイコンハシ	1000 倍	100～300 L/10a	収穫 3 日前 まで	3 回以内	散布	3 回以内
	コガ アムシ ハモシヨトウ ハイダラメガ オタバコガ カブラハエ類	1000～2000 倍					
ブロッコリー	コガ ハモシヨトウ アムシ シイモシヨトウ	1000～2000 倍	100～300 L/10a	収穫 3 日前 まで	3 回以内	散布	3 回以内
茎ブロッコリー	ハモシヨトウ	2000 倍	100～300 L/10a	収穫 3 日前 まで	3 回以内	散布	3 回以内
ねぎ	シイモシヨトウ ネコガ	1000～2000 倍	100～300 L/10a	収穫 3 日前 まで	3 回以内	散布	3 回以内
	ネコガ アザミウマ ハメグリハエ類	1000 倍					
たまねぎ	ハモシヨトウ シイモシヨトウ	2000 倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで	3 回以内	散布	3 回以内

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	レピメクチンを含む 農薬の総使用回数
だいこん	コガ アムシ ハイマダラノメイガ カブラハバチ類	1000～2000 倍	100～300 L/10a	収穫3日前 まで	3回以内	散布	3回以内
かぶ	コガ	1000 倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内
	キジノミムシ	2000 倍					
ヤングコーン	材タバコガ	1000 倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内
未成熟とうもろこし	材タバコガ ツマジロクサヨトウ	1000 倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内
	ハセンヨトウ	2000 倍					
食用金魚草	ハセンヨトウ	2000 倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内
食用なでしこ	ハセンヨトウ	2000 倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内
食用プリムラ	ハセンヨトウ	2000 倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内
食用カーネーション	ハセンヨトウ	2000 倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内
食用アザミ	ハセンヨトウ	2000 倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内
食用せんにちこう	ハセンヨトウ	2000 倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内
食用トリア	ハセンヨトウ	2000 倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内
食用パンジー	ハセンヨトウ	2000 倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内
しそ科葉菜類 (しそを除く)	ハセンヨトウ	2000 倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内
しそ (花穂)	ハセンヨトウ	2000 倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内
しそ	ハセンヨトウ シサビダニ	2000 倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内
食用ぎく	材タバコガ ハセンヨトウ	2000 倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内
きく(葉)	材タバコガ ハセンヨトウ	2000 倍	100～300 L/10a	収穫3日前 まで	3回以内	散布	3回以内
茶	チャノコカクモンハマキ	1000～2000 倍	200～400 L/10a	摘採7日前 まで	2回以内	散布	2回以内

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	レピメクチンを含む農薬の総使用回数
きく	オタハコガ ハスモントウ	1000～2000 倍	100～300 L/10a	発生 初期	6 回以内	散布	6 回以内
	マメモグリハエ	1000 倍					
カーネーション	オタハコガ	1000～2000 倍	100～300 L/10a	発生 初期	6 回以内	散布	6 回以内
ストック	コガ	1000～2000 倍	100～300 L/10a	発生 初期	6 回以内	散布	6 回以内
りんどう	リンドウハナキ	2000 倍	100～300 L/10a	発生 初期	6 回以内	散布	6 回以内

使用上の注意事項

- (1) 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにすること。
- (2) ミツバチ、マルハナバチに影響を与える場合があるので、ミツバチ等の巣箱及びその周辺にかからないようにすること。
- (3) 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ調節すること。
- (4) 本剤は自動車や壁などの塗装面に散布液がかかると変色する恐れがあるので、散布液がかからないように注意すること。
- (5) 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- (6) 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

人畜に有毒な農薬については、その旨及び解毒方法

- (1) 誤飲などのないよう注意すること。誤って飲み込んだ場合には吐かせないで、直ちに医師の手当を受けさせること。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けること。
- (2) 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。使用後は洗眼すること。

水産動植物に有毒な農薬については、その旨

- (1) 水産動植物（甲殻類）に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用すること。
- (2) 使用残りの薬液が生じないよう調製を行い、使い切ることを。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないこと。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理すること。

引火し、爆発し、又は皮膚を害する等の危険のある農薬については、その旨

危険物第四類第三石油類に属するので火気には十分注意すること。

貯蔵上の注意事項

火気をさけ、直射日光の当たらない低温な場所に密栓して保管すること。