

登録番号 第 23785 号

ピカット®フロアブル

- 作用機構の異なった薬剤との混合剤で、耐性菌の発生を抑えます。
 特長： ●葉の表面から組織中への浸透性を有しています。
 ●収穫前日まで使用できます。

有効成分	ペンチオピラド(化管法第1種)・・・8.0% メパニピリム・・・10.0%	包装	500ml×20
性状	類白色水和性粘稠懸濁液体	有効年限	5年
毒性	普通物*	危険物	-

※普通物：「毒物及び劇物取締法」（厚生労働省）に基づく、特定毒物、毒物、劇物の指定を受けない物質を示す。

【適用病害及び使用方法】

2020年10月14日付内容

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ペンチオピラドを含む農薬の総使用回数	メパニピリムを含む農薬の総使用回数
きゅうり	灰色かび病 うどんこ病 褐斑病 菌核病 黒星病	1000倍	100～300 L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内	4回以内
なす	灰色かび病 うどんこ病 すすかび病	1000倍	100～300 L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内	4回以内
トマト	灰色かび病 うどんこ病 葉かび病	1000倍	100～300 L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内	4回以内
ミニトマト	灰色かび病 うどんこ病 葉かび病	1000倍	100～300 L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内	4回以内
すいか	うどんこ病 つる枯病	1000倍	100～300 L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内	4回以内
メロン	うどんこ病 つる枯病	1000倍	100～300 L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内	4回以内
いちご	灰色かび病 うどんこ病 黒斑病	1000倍	100～300 L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内	3回以内
ゆり	葉枯病	1000倍	100～300 L/10a	発病前～ 発病初期	3回以内	散布	3回以内	5回以内

使用上の注意事項-----

- (1) 使用前によく振ってから使用すること。
- (2) 薬剤耐性菌の出現を防ぐため、本剤の過度の連用はさけ、なるべく作用性の異なる薬剤との輪番で使用すること。
- (3) 空容器は圃場などに放置せず、適切に処理すること。
- (4) 本剤の使用に当っては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

人畜に有毒な農薬については、その旨及び解毒方法-----

通常の使用方法ではその該当がない。

水産動植物に有毒な農薬については、その旨-----

この登録に係る使用方法では該当がない。

引火し、爆発し、又は皮膚を害する等の危険のある農薬については、その旨-----

通常の使用方法ではその該当がない。

貯蔵上の注意事項-----

直射日光を避け、食品と区別して、なるべく低温な場所に密栓して保管すること。